

Tavanic wurde bisher von 28 sanego-Benutzern, wo Sehnenentzündung auftrat, mit durchschnittlich 3,5 von 10 möglichen Punkten bewertet.

Erfahrungsberichte über Sehnenentzündung bei Tavanic:

Tavanic für Unterbauchbeschwerden mit Gelenkprobleme, Sehnenentzündung, eingeschränkte Belastbarkeit

VORSICHT!! Dieses Medikament kann schwerste KÖRPERVERLETZUNG darstellen!! 2 Tabletten TAVANIC haben vor 12 Monaten meine Gesundheit und meine Lebensqualität massiv angegriffen! Leben vor Tavanic: Jogging, Mountainbike, Fitness, Bergsteigen, Windsurfen und top Blutwerte im großen Blutbild. Leben nach 12 Monaten und 2 Tavanic: immer noch partiell Krücken, permanent Sehnenbandagen, immer wieder auf fremde Hilfe angewiesen, manchmal war ich nur wenige Meter am Tag gehfähig, extreme Sehnen und Gelenkprobleme. Es ist unfassbar, wirklich UNFAßBAR, daß 2 Tabletten in der Lage sind, einen Menschen so massiv anzugreifen und zu schädigen. Statistisch ist dies eine seltene Nebenwirkung (die USA sieht das anders/Black-Box-Warnung!), aber Du weißt nicht ob es nicht Dich trifft, denn laut Hersteller reicht schon 1 (!!) Tablette um Schaden anzurichten. Alle, die über dieses tolle Medikament jubeln, sollten erstmal abwarten, denn einige Beschwerden treten erst 4-10 Monate nach der Einnahme auf. [mehr...](#)

Tavanic für Bronchitis, Fieber mit Sehnenentzündung, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Panikattacken, Muskelschwäche, Müdigkeit

Nach 2 Tagen Tavanic im April 2007 Entzündung der Achillessehne links (später auch rechts! + Arm- und Fingersehnen entzündet. Schwerste Muskel- und Gelenkschmerzen, nachts Panikattacken. Zusätzlich zu den furchtbaren Schmerzen in den Beinen, dem Rücken und Gesäß eine unglaubliche Muskelschwäche in den Beinen. Dazu kamen Erschöpfungszustände und Dauermüdigkeit. Heute, 1,5 Jahre später: immer noch schwerste Muskelschmerzen in den Beinen und dem Gesäß + Muskelschwäche. Normales Leben völlig unmöglich. Jeder Tag kaum zu bewältigen, nur Schmerz. Alle anderen möglichen Ursachen wurden zwischenzeitlich medizinisch abgeklärt und ausgeschlossen. Orthopäden und Fachmediziner anderer Richtungen bestätigen mir den Kausalzusammenhang mit der Tavanic-Einnahme. Bis zu der Tavanic-Einnahme hatte ich auch keinerlei Probleme und stand aktiv und sportlich im Leben. Achtung: Es gibt ein Leben vor Tavanic ... und eines danach!!! Danach ist nichts mehr wie es vorher war! [mehr...](#)

Tavanic für Prostatitis mit Sehnenentzündung

4 Jahre nach der Einnahme unvermindert schwer Gehbehindert, verbunden mit starken Belastungsschmerzen. Seit der Einnahme voll erwerbsunfähig, inzwischen, nach jahrelangen gutachterlichen und gerichtlichen Schlachten rentenrechtlich anerkannt.

Ein wesentliches Problem liegt im Beweis der Kausalität, da die Schädigung häufig erst nach einer längeren Latenzzeit eintritt.

In der im Herbst 2012 erscheinenden, neu überarbeiteten Fachinformation von Tavanic (Wirkstoff: Levofloxacin)

wird erstmalig vom Hersteller selbst auf die potentielle, monatelange Latenzzeit von Sehnenrupturen und Tendinitis hingewiesen:

Selten kann es zu einer Tendinitis kommen. Sie betrifft am häufigsten die Achillessehne und kann zu einer Sehnenruptur führen. Tendinitis und Sehnenruptur (manchmal bilateral) können während der ersten 48 Stunden nach Behandlungsbeginn auftreten und sind bis zu mehreren Monaten nach Behandlungsende berichtet worden.

http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20120731123673/anx_123673_de.pdf

Plötzlich auftretende, undefinierbare Schmerzen am Bewegungsapparat und mehr oder weniger starke Einschränkungen in der Mobilität werden aus Unkenntnis häufig als Fibromyalgie, Polyneuropathie oder psychosomatisches Schmerzsyndrom diagnostiziert. Sehnenrupturen können spontan bei Alltagstätigkeiten, ohne erkennbare massive, äußere Einwirkung auftreten. Obige Information könnte einen Anhaltspunkt darstellen, in solchen Fällen eine ggf. auch längere Zeit zurückliegende Einnahme von Tavanic zu eruieren. Zudem könnte die Frage nach einer, aufgrund dieser Tatsache möglichen, hohen Dunkelziffer an Tavanic induzierten Sehnenenerkrankungen in den letzten 2 Jahrzehnten, aufgeworfen werden. [mehr...](#)

Tavanic für Urol. Infekt mit Sehnenentzündung

Hallo,

ich habe seit 4 Monaten starke Entzündungen und Schmerzen an Sehnen und versch. Gelenken und bin seither rel. immobil und arbeitsunfähig.

Da leider täglich weitere Betroffene dazukommen, welche unter starken Schmerzen und Bewegungseinschränkungen nach Levofloxacin leiden hier nochmals der Hinweis auf eine Seite zu dieser Problematik:

<http://tavanic-und-fluorchinolone-achillessehnen-knorpelschaden.over-blog.de/>

Um darauf aufmerksam zu machen, Hilfestellung zu geben oder einfach Kontakte zu knüpfen bitte die eigene Geschichte dort, ggf. auch anonym, veröffentlichen. Jedes neue Opfer ist eines zuviel! [mehr...](#)

Tavanic für Nasennebenhöhlenentzündung mit Achillessehnenentzündung, Sehnenentzündung

Musste Tavanic 500 mg bei Behandlung einer Sinusitis (Nasennebenhöhlen ...) nach drei Tagen am Pfingstsonntag abbrechen und zur Wochenenddienst-Notzentrale, weil ich massive Schmerzen in beiden Achillessehnen bekam. Der Arzt diagnostizierte eine akute Entzündung beider Achillessehnen und verordnete mir Ruhe und Schonung; außerdem bekam ich ein neues Antibiotikum.

Diese Nebenwirkung "Schmerzen an den Sehnen" ist im Beipackzettel beschrieben mit "selten" 1/1000.

Die erwünschte Wirkung setzte allerdings auch heute ein; trotzdem musste ich das Mittel absetzen. [mehr...](#)

Tavanic für Blasenentzündung mit Sehnenentzündung

Von einem ärztlichen Sonntagsdienst bekam ich wegen meiner akuten Blasenentzündung Tavanic 500 verschrieben 5 Tab. Das Medikament wirkte bei der Blasenentzündung sofort.

Nach Ende der Einnahme bekam ich eine Sehnenentzündung bis in die Kniekehle.

Auch nach über einer Woche kann ich nur mit Krücke laufen!!

Wird nur ganz ganz langsam besser. [mehr...](#)

Tavanic für Helicobacter-pylori-Gastritis mit Sehnenentzündung, Schmerzen

Am 5. Tag der Einnahme von Tavanic überraschendes Auftreten einer Achillessehnen-Entzündung an beiden Beinen. Sehr schmerzhaft. Gehen extrem behindert. Am 7. Tag Tavanic abgesetzt. Im Verlauf von 4 Wochen extrem langsame Besserung. Weiterhin starke Gehbeschwerden. Behandlung mit Imbun (retard wegen der Magenprobleme). Linderung aber keine Besserung.

Nach ca. 6 Wochen bei einem Schritt von einem ca 50cm hohen Podest im voranschreitenden (Linken) Bein (Achillessehne) extremer Schmerz, der aber nach ca 2 min. etwas abklingt. Weiterer Schmerz wird gedeutet als erneute Verschlimmerung der Sehnenentzündung durch den Fehltritt. Kein für AS Ruptur typischer "Knall", keine Blutergüsse.

Nach weiteren 4 Wochen MRT mit Befund einer kompletten AS Ruptur links.

Eine Woche später operatives Zusammenführen der beiden Bandenden. Probleme bei der Überdeckung mit Haut (zu kurz).

Der Heilungsprozess ist jetzt 8 Tage im Gange auf Einschienung (gehalten von Verband).

AS am anderen Bein deutlich besser und kaum noch schmerzhaft. Stehen auf den Zehenspitzen an diesem Bein möglich. Endgültiges bleibt abzuwarten. Die Regenerierung der Haut wird als sehr problematisch angesehen vom Operateur. Wobei sich nach 8 Tagen einige positive Anzeichen feststellen liessen, die zumindest eine erste vage Hoffnung auf glückhafte Regeneration zulassen.

So far. [mehr...](#)

Tavanic für Beckenbodenschmerzen mit Sehnenentzündung

Nach 5. Einnahmetag starke Sehnschmerzen beide Handgelenke und Achillessehnen.

Seit 6 Wochen arbeitsunfähig, da ich kaum Wege außerhalb der Wohnung bewältigen kann.

Entzündungshemmer und Physio bringen keinerlei Änderung.

Bfarm, Hersteller und Ärzte informiert, da ich denke, dass dieses Risiko noch stark unterschätzt wird. [mehr...](#)

Tavanic für Urologische Infektion mit Sehnenentzündung

Nach 5. Einnahmetag von 250 mg traten plötzlich heftige Achillessehnen- und Sehnenentzündungen in beiden Armen auf, Tavanic wurde sofort

abgesetzt und eine Therapie mit COX-2, klassischen NSAR, Physiotherapie eingeleitet.

Diagnose Sehnenentzündungen bedingt durch Tavanic. Diese Sehnenentzündungen der Achilles. halten nun seit 9 Wochen an (arbeitsunfähig!) und verschlechtern sich eher, als dass sie leichter werden. Im MRT sind nun Reizergüsse in den oberen Sprunggelenken und Knorpelschäden erkennbar. Ggf. steht Klinikaufenthalt und absolute Ruhigstellung beider (!) Beine an, weitere Massnahmen zur Therapie der Knorpelschäden werden von der Orthopädie eingeleitet.

Hersteller, Ärzte, Apotheke und Bfarm habe ich informiert, da dieses Nebenwirkungspotential allgemein noch viel zu wenig bekannt ist. [mehr...](#)

Tavanic für Sinusitis mit Gelenkschmerzen, Sehnenentzündung, Muskelzuckungen

Nach 4 Tagen Tavanic im März 2009 traten an Gelenken und Sehnen starke Schmerzen auf. Es musste der Hausarzt aufgesucht werden. Die Schmerzen wurden so stark, dass ich nicht mehr laufen konnte. Ebenso sind Muskelzuckungen aufgetreten. Die Schmerzen halten jetzt schon seit 6 Wochen an, ohne dass eine Besserung eingetreten ist. Laut Aussage meines Hausarzt gehen die Nebenwirkung wieder weg, stimmt das? Und wie lange dauert das? Wer kann mir aus Erfahrung berichten, ob und wann diese Nebenwirkungen wieder nachlassen, oder was ich tun soll?

DANKE für die Antworten! [mehr...](#)

Tavanic für Bronchitis (akut) mit Sehnenentzündung, Schmerzen

Nach der Einnahme am 5. Tag bekam ich eine Achillessehnen-Entzündung, obwohl ich aufgrund einer Bronchitis nur auf der Couch lag. Die Schmerzen wurden so stark, dass ich nicht mehr laufen konnte. Die Schmerzen halten jetzt schon seit 4 Wochen an, ohne dass eine Besserung eingetreten ist. Als Marathonläufer hatte ich bisher keinerlei Achillessehnen-Probleme. [mehr...](#)

Tavanic für Spritzenabszess mit Muskelschmerzen, Sehnenentzündung

Nach einem Spritzenabszess wurde mir von meinem HA Tavanic 500 verordnet, mit dem Hinweis, dass nach seinen Erfahrungen Tavanic sehr gute Wirkung bei Weichteilinfekten zeigt. Ich habe das Medikament 5 Tage nach Vorschrift genommen - mit recht guten Ergebnissen. Nach drei einnahmefreien Tagen nahmen die Schmerzen an der Stelle des Spritzenabszesses wieder rapide zu. Mein HA riet mir zu einer weiteren 5-tägigen Einnahme um eine OP zu vermeiden.

Am zweiten Tag der erneuten Einnahme setzten starke Muskelschmerzen in den Beinen ein. Am dritten Tag bekam ich so starke Schmerzen in den Achillessehnen, dass es mir kaum noch möglich war zu laufen.

Der HA ordnete an, das Antibiotikum sofort abzusetzen und riet mir die Beine zu schonen und zu kühlen.

Von dem Zusammenhang zwischen meine Beschwerden und Tavanic erfuhr ich erst aus dem Netz. [mehr...](#)

Tavanic für Achillessehnenentzündung mit Sehnenentzündung

Bereits nach 3 Tage Schmerzen in beiden Achillessehnen mit Behandlungsdauer ansteigend. Nach 8 Tagen Abbruch, Schmerzen dauern an und lassen unter ASS-

Behandlung langsam nach. Hoffe noch, dass keine Dauerschädigung eingetreten ist...
[mehr...](#)

Tavanic für Sehnen- und Venenentzündung mit Sehnenentzündung, Venenleiden

Nach 3 Tagen Einnahme Sehnenentzündung erst am rechten kurz darauf auch am linken Bein. Habe dieses Medikament sofort abgesetzt.

Entzündung am rechten Bein ist zurückgegangen. Am linken Bein ist die Sehnenentzündung in eine Venenentzündung übergegangen. Seit 2 Wochen erhebliche Beschwerden. Jetzt Behandlung mit Injektionslösung zur Behebung der Venenentzündung.

Hoffentlich keine bleibenden Schäden.

Ich kann dieses Medikament nicht empfehlen. Vorsicht !!! [mehr...](#)

Tavanic für schwere bronchitis mit Sehnenentzündung

Nach 5maliger Einnahme stellten sich unerträgliche Schmerzen an beiden Achillessehnen ein, die trotz sofortiger Absetzung des Arzneimittels bis jetzt - nach drei Tagen - unverändert anhalten. [mehr...](#)

Tavanic für Ohrenentzündung, Blasenentzündung mit Sehnenentzündung, Schmerzen, Muskelschmerzen

Ersteinnahme von Tavanic 2005, letzte Einnahme Mai 2009. Seit 2005 Probleme mit Achillessehne rechts, immer schlimmere Schmerzen, seit Dez. 2008 auch rechts, Anfang 2009 Einriss der rechten Sehne. Starke Muskelschmerzen am ganzen Körper, Beschwerden am linken Ellenbogen und an der rechten Schulter. Bei letztmaliger Einnahme im Mai hatte ich sämtliche Symptome der letzten Jahre verstärkt innerhalb von 2 Std. nach Einnahme! Habe dann die Symptome in Google eingegeben und der erste Treffer war TAVANIC. Ich habe die Behandlung der letzten Jahre mal mit meinen Beschwerden an Muskeln und Sehnen quergeprüft und mir ist aufgefallen, dass diese Probleme immer 3-4 Monate nach der Einnahme von Tavanic aufgetreten sind (ausser beim letzten Mal) Eine Besserung ist nie eingetreten, auch nach Behandlung mit Voltaren, Cortison etc. nach einem Orthopädenbesuch, es konnte eigentlich nie eine Ursache festgestellt werden, Seit Anfang September 2009, die letzte Einnahme liegt 4 Monate zurück und siehe da, habe ich brutale Schmerzen an den Achillessehnen (kann kaum laufen), nicht das diese jemals weg gewesen wären, aber dieses Mal ist es extrem! Ein Physiotherapeut und auch mein Urologe bestätigen, dass dies von Tavanic herrühren kann! Eine Meldung an BGA und Hersteller durch den Urologen ist erfolgt!

Und nun zum Glück im Unglück: Da ich keine Lust mehr hatte, mich von div. Ärzten noch mehr mit Medikamenten vollpumpen zu lassen (auch diese habe Nebenwirkungen => siehe Voltaren) und verdrängen letztendlich nur die Schmerzen aber nicht die Ursache, setzt du das Medikament ab, dann gehts wieder mit den Schmerzen los, j, da habe ich mich entschlossen mal wieder die gute alte Medizin zu versuchen. Nach nunmehr 4 Wochen Behandlung mit NEO-BALLISTOL (morgens), PFERDESALBE mittags, abends und paralleler Einnahme von HEKLA LAVA D2 alle Stunde (12 am Tag), habe ich eine deutliche Verbesserung, KEINE Schmerzen in Ruhephasen und selbst das Laufen ist fast wieder schmerzfrei möglich. Ich hoffe es hält an und es hilft Euch auch! Kostet auf den Monat gesehen gerade mal ca. 25 Euro und das ist der Versuch doch wert und vor allen Dingen, das Zeug hat KEINE Nebenwirkungen! [mehr...](#)

Tavanic für Prostatitis mit Muskelschmerzen, Sehnenentzündung

Nebenw.: Muskelschmerzen, Sehnenentzündung.

Einnahme nach dem 5. Tag abgebrochen bzw. Behandlung mit einem anderen Antibiotikum fortgesetzt. [mehr...](#)

Tavanic für Lungenentzündung mit Sehnenentzündung, Tremor

Ich hatte bereits vor ca. 1 Jahr Tavanic wegen eines Atemwegsinfekts bekommen. Nach 3 Tagen mußte es aufgrund von Sehnenentzündungen in Händen, Handgelenken, Knien, Füßen abgesetzt werden. Dieses Mal nehme ich es seit 3 Tagen und es ist das gleiche Problem aufgetreten. Die Wirkung ist gut, die Nebenwirkungen jedoch sind schwerwiegend und grenzen schon an Körperverletzung. Da es das 2. Antibiotikum ist binnen 2 Wochen, mein Hausarzt nicht da ist, kann ich es nicht einfach absetzen und hoffe, dass meine Sehnen durchhalten werden. [mehr...](#)

Tavanic für Chlamydien mit Sehnenentzündung

Sehnenentzündung [mehr...](#)

Erfahrungsberichte über Schmerzen bei Tavanic:

Tavanic für Lungenentzündung mit Schmerzen, Schmerzen in den Füßen

Nach der Einnahme von Tavanic (7 Tage) konnte ich nicht mehr richtig auftreten, geschweige denn laufen.

Beide AS sind betroffen und ich mache mir große Sorgen, nachdem ich die Bewertungen anderer Patienten gelesen habe. Muss ich jetzt damit rechnen, dass die "Nebenwirkungen" in dieser Form bestehen bleiben.

Seit 3 Tagen sind die Schmerzen trotz Voltaren, Fersenkeil und ASbandage unverändert!!!!

Kann mir jemand dazu etwas "sagen"??? [mehr...](#)

Tavanic für Helicobacter-pylori-Gastritis mit Sehnenentzündung, Schmerzen

Am 5. Tag der Einnahme von Tavanic überraschendes Auftreten einer Achillessehnen-Entzündung an beiden Beinen. Sehr schmerzhaft. Gehen extrem behindert. Am 7. Tag Tavanic abgesetzt. Im Verlauf von 4 Wochen extrem langsame Besserung. Weiterhin starke Gehbeschwerden. Behandlung mit Imbun (retard wegen der Magenprobleme). Linderung aber keine Besserung.

Nach ca. 6 Wochen bei einem Schritt von einem ca 50cm hohen Podest im voranschreitenden (Linken) Bein (Achillessehne) extremer Schmerz, der aber nach ca 2 min. etwas abklingt. Weiterer Schmerz wird gedeutet als erneute Verschlimmerung der Sehnenentzündung durch den Fehltritt. Kein für AS Ruptur typischer "Knall", keine Blutergüsse.

Nach weiteren 4 Wochen MRT mit Befund einer kompletten AS Ruptur links.

Eine Woche später operatives Zusammenführen der beiden Bandenden. Probleme bei der Überdeckung mit Haut (zu kurz).

Der Heilungsprozess ist jetzt 8 Tage im Gange auf Einschienung (gehalten von Verband).

AS am anderen Bein deutlich besser und kaum noch schmerzhaft. Stehen auf den Zehenspitzen an diesem Bein möglich. Endgültiges bleibt abzuwarten. Die Regenerierung der Haut wird als sehr problematisch angesehen vom Operateur. Wobei sich nach 8 Tagen einige positive Anzeichen feststellen liessen, die zumindest eine erste vage Hoffnung auf glückhafte Regeneration zulassen.

So far. [mehr...](#)

Tavanic für Bronchitis (akut) mit Sehnenentzündung, Schmerzen

Nach der Einnahme am 5. Tag bekam ich eine Achillessehnen- Entzündung, obwohl ich aufgrund einer Bronchitis nur auf der Couch lag. Die Schmerzen wurden so stark, das ich nicht mehr laufen konnte. Die Schmerzen halten jetzt schon seit 4 Wochen an, ohne das eine Besserung eingetreten ist. Als Marathonläufer hatte ich bisher keinerlei Achillessehnen-Probleme. [mehr...](#)

Tavanic für Magenprobleme, Ganzkörperschmerzsyndrom, Laufen kaum möglich, morgendlicher Anlaufschmerz mit Schmerzen

Nie wieder Tavanic, Ganzkörperschmerzen, Laufen kaum möglich, morgendlicher Anlaufschmerz. Die Wirksamkeit bei rezidivierenden Harnwegsinfekten ist nicht berauschend. [mehr...](#)

Tavanic für Ohrenentzündung, Blasenentzündung mit Sehnenentzündung, Schmerzen, Muskelschmerzen

Ersteinnahme von Tavanic 2005, letzte Einnahme Mai 2009. Seit 2005 Probleme mit Achillessehne rechts, immer schlimmere Schmerzen, seit Dez. 2008 auch rechts, Anfang 2009 Einriss der rechten Sehne. Starke Muskelschmerzen am ganzen Körper, Beschwerden am linken Ellenbogen und an der rechten Schulter. Bei letztmaliger Einnahme im Mai hatte ich sämtliche Symptome der letzten Jahre verstärkt innerhalb von 2 Std. nach Einnahme! Habe dann die Symptome in Google eingegeben und der erste Treffer war TAVANIC. Ich habe die Behandlung der letzten Jahre mal mit meinen Beschwerden an Muskeln und Sehnen quergeprüft und mir ist aufgefallen, dass diese Probleme immer 3-4 Monate nach der Einnahme von Tavanic aufgetreten sind (ausser beim letzten Mal) Eine Besserung ist nie eingetreten, auch nach Behandlung mit Voltaren, Cortison etc. nach einem Orthopädenbesuch, es konnte eigentlich nie eine Ursache festgestellt werden, Seit Anfang September 2009, die letzte Einnahme liegt 4 Monate zurück und siehe da, habe ich brutale Schmerzen an den Achillessehnen (kann kaum laufen), nicht das diese jemals weg gewesen wären, aber dieses Mal ist es extrem! Ein Physiothrapeut und auch mein Urologe bestätigen, dass dies von Tavanic herrühren kann! Eine Meldung an BGA und Hersteller durch den Urologen ist erfolgt!

Und nun zum Glück im Unglück: Da ich keine Lust mehr hatte, mich von div. Ärzten noch mehr mit Medikamenten vollpumpen zu lassen (auch diese habe Nebenwirkungen => siehe Voltaren) und verdrängen letztendlich nur die Schmerzen

aber nicht die Ursache, setzt du das Medikament ab, dann gehts wieder mit den Schmerzen los, j, da habe ich mich entschlossen mal wieder die gute alte Medizin zu versuchen. Nach nunmehr 4 Wochen Behandlung mit NEO-BALLISTOL (morgens), PFERDESALBE mittags, abends und paralleler Einnahme von HEKLA LAVA D2 alle Stunde (12 am Tag), habe ich eine deutliche Verbesserung, KEINE Schmerzen in Ruhephasen und selbst das Laufen ist fast wieder schmerzfrei möglich. Ich hoffe es hält an und es hilft Euch auch! Kostet auf den Monat gesehen gerade mal ca. 25 Euro und das ist der Versuch doch wert und vor allen Dingen, das Zeug hat KEINE Nebenwirkungen! [mehr...](#)

Tavanic für Bronchitis (akut) mit Schmerzen, Bewegungseinschränkung

Nach der ersten Einnahme von Tavanic im Januar 2008 wegen einer akuten Bronchitis bekam ich sehr starke Schmerzen im Oberkörper.

Zahlreiche Untersuchungen schlossen organische Ursachen aus. Die Schmerzen und mein Allgemeinbefinden besserten sich nach ca. 5 Monaten. Ein Zusammenhang zur Einnahme von Tavanic wurde damals nicht hergestellt.

Im November 2008 erkrankte ich erneut an akuter Bronchitis und erhielt wiederum Tavanic. Nach 5 Tagen der Einnahme traten die starken Schmerzen im Oberkörper erneut auf. Zusätzlich machten sich starke Schmerzen im rechten Ellenbogen und eine Bewegungseinschränkung in der Art bemerkbar, dass der rechte Arm nicht mehr gerade gestreckt werden kann.

Nachdem wiederum organische Ursachen ausgeschlossen wurden, entstand bei mir und meiner Hausärztin der Verdacht, dass die Beschwerden mit der Einnahme des Medikaments Tavanic in Zusammenhang stehen.

Während die Schmerzen im Oberkörper nach ca. 5 Monaten wieder abgeklungen sind, dauern die Beschwerden im rechten Arm an. Röntgenologisch und im MRT wurde ein Erguss im rechten Ellenbogengelenk festgestellt. Die Blutwerte weisen jedoch keinerlei Entzündungsmerkmale auf.

Die Vorstellung bei zahlreichen Fachärzten verlief ergebnislos. Die Rückfrage bei dem Arzneimittelhersteller Aventis brachte keine Aussage, wie den Beschwerden begegnet werden kann.

Auch alternative Behandlungsformen wie Akkupunktur und Magnetfeldtherapie brachten keine Linderung.

Neben den ständigen Schmerzen ist mein rechter Arm seither nur noch eingeschränkt nutzbar. Insbesondere das Tragen und Heben ist nicht mehr möglich. [mehr...](#)

Tavanic für Bronchitis mit Schmerzen

Ich hatte Bronchitis, bekam ein Antibiotika das wirkte, aber nicht 100%tig. Durch röntgen wurde ein verdächtiger Nachlass gefunden. Dann verschrieb mir mein Hausarzt Tavanic 500mg : 1/2 Tablette pro Tag während 10 Tage. Am vierten Tag der Behandlung mit Tavanic, konnte Ich fast nicht mehr laufen und stehen wegen der Schmerzen im rechten Fuss. Ich setzte das Medikament ab ohne Rücksprache mit meinem Arzt.

Beim heutigen Arztbesuch bestätigte mir dieser, dass Tavanic nicht harmlos sei. Er verschrieb mir ein anderes Antibiotika.

Tavanic ist teuer.

Ich weiss nicht ob es gewirkt hat, weil es nur durch röntgen festzustellen wäre.

Die Schmerzen im Fuss gingen deutlich zurück. [mehr...](#)

Tavanic für Lungenentzündung mit *Muskelschmerzen, Schmerzen*

sehr starke Muskelschmerzen, Sehnenschmerzen, Achillessehne, Schultern, Arme, Knie, Gesäß, fast am gesamten Körper. [mehr...](#)

Tavanic für Implantat-OP mit *Schwellungen, Schmerzen*

Nach mehrwöchiger Einnahme in Kombination mit Metronidazol mittlerweile am rechten Bein eine sehr starke Schwellung des Oberschenkels und des Knies verbunden mit Schmerzen. [mehr...](#)

Tavanic für Atemwegsverkrampfung, Bronchitis, hohes Fieber, bakter. Auswurf mit *Unruhe, Atemnot, Schmerzen, Schwindel, Panikattacken*

nach einem gripp. Infekt bekam ich aufgrund Bakterienbesiedlung eine heftige Bronchitis und hohes Fieber und daraufhin das Medikament Tavanic 250, 1x tägl., verschrieben.

Ein paar Stunden nach der ersten Einnahme bekam ich Herzklopfen und Unruhe, am nächsten Tag (2. Einnahme) sehr starke Atemnot, starke Schmerzen in den Beinen, Schmerzen in den Händen, Schwindel, Panikattacken.

Am dritten Tag wurde ich auf ein anderes Antibiotikum umgestellt. [mehr...](#)

Tavanic für Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Fieber, Gelenkschmerzen mit *Hydrocele, Schmerzen in der Leiste, Schmerzen, Schweißausbrüche*

Anschwellen des Hodens, starke Schmerzen im den Unterarmen, Schmerzen in den Leisten und Unterbauch (Prostata), Schweißausbrüche [mehr...](#)